

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2008

Section: B, C

Branche: Physique

Numéro d'ordre du candidat

I Mouvement des satellites

13 p.


Un satellite tourne autour de la Terre dans le plan de l'équateur.

1. Écrire la 2^e loi de Kepler. Que peut-on en déduire quant à la variation de la vitesse du satellite sur sa trajectoire? *3 p.*
2. Dans la suite, la trajectoire est supposée circulaire. Montrer que le mouvement du satellite est uniforme. Calculer sa vitesse v en fonction de l'altitude z , de la masse de la Terre M_T et du rayon R du globe terrestre. *4 p.*
3. Définir et exprimer la période de révolution du satellite en fonction de z . *2 p.*
4. Le satellite tourne dans le même sens que la Terre. L'intervalle de temps entre deux passages successifs du satellite à la verticale d'un même point de l'équateur est 10,4 h. Déterminer la période du satellite et en déduire son altitude. *4 p.*

II Champ électrique uniforme

12 p.

Un oscilloscope est constitué, entre autres, d'un condensateur formé par les plaques A et B et d'un écran. Un faisceau d'électrons entre en O dans le condensateur, parallèlement à l'axe des x . Les plaques sont distantes de 4 cm et ont une longueur de 10 cm. On observe l'impact des électrons sur l'écran.



1. L'application d'une tension positive U entre les plaques A et B fait dévier les électrons vers les y positifs. Représenter sur une figure les vecteurs champ et force électriques ainsi que la polarité du condensateur. *2 p.*
2. Établir les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un électron en fonction de U et de v_0 , valeur de sa vitesse en O . *6 p.*
3. Avant d'entrer dans le condensateur, les électrons quasiment immobiles sont accélérés sous une tension de 200 V. Calculer la vitesse v_0 des électrons. *2 p.*
4. Calculer l'ordonnée du point d'impact sur l'écran si on applique au condensateur une tension $U = 40$ V. *2 p.*

Epreuve écrite

Examen de fin d'études secondaires 2008

Section: B, C

Branche: Physique

Numéro d'ordre du candidat

III Ondes mécaniques

13 p.

1. Discuter qualitativement et à l'aide de figures la double périodicité du phénomène de propagation d'ondes sinusoïdales. 4 p.
2. Un vibreur, de fréquence 50 Hz, produit en un point O d'une corde tendue une perturbation transversale, sinusoïdale, d'amplitude 5 mm, se propageant à la célérité constante de 8 m/s.
 - a) Écrire l'équation du mouvement du vibreur sachant qu'à la date $t = 0$ il passe par sa position d'équilibre en se déplaçant vers le bas. 3 p.
 - b) Établir l'équation des ondes se propageant sur la corde. 3 p.
 - c) Écrire l'équation horaire du point M de la corde situé à 24 cm de O . Comparer les mouvements de O et de M . Calculer l'élongation et la vitesse du point M à l'instant $t = 0,0825$ s. 3 p.

IV L'effet photoélectrique

11 p.

1. Qu'est-ce qu'on entend par effet photoélectrique? Énoncer l'hypothèse qui est la base du modèle corpusculaire de la lumière. Utiliser ce modèle pour donner une interprétation de l'effet photoélectrique. 4 p.
2. Une plaque de césium est éclairée par une lumière monochromatique de longueur d'onde 540 nm. L'énergie cinétique maximale de sortie des électrons est 0,34 eV.
 - a) Calculer le travail d'extraction en eV. 2 p.
 - b) L'intensité de la lumière monochromatique est augmentée. Indiquer, en justifiant la réponse, si les grandeurs suivantes changent ou restent invariantes : travail d'extraction, énergie cinétique maximale de sortie des électrons, nombre d'électrons sortis par unité de temps. 3 p.
 - c) Est-ce qu'une lumière de longueur d'onde 700 nm peut extraire des électrons de la plaque de césium? Justifier la réponse. 2 p.

V L'atome de Bohr

11 p.

1. Énoncer les deux postulats de Bohr. Illustrer le deuxième postulat à l'aide de figures. 5 p.
2. Établir, dans le cadre du modèle de Rutherford, la relation entre la vitesse de l'électron d'un atome d'hydrogène et le rayon de la trajectoire. Utiliser les postulats de Bohr pour exprimer le rayon en fonction du nombre quantique principal. 4 p.
3. Calculer la valeur limite de la longueur d'onde d'un photon absorbé pour ioniser un atome d'hydrogène dans son état fondamental. S'agit-il d'une valeur maximale ou minimale? 2 p.